



**ĐẠI HỌC CẦN THƠ - KHOA NÔNG NGHIỆP**

**GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN**

Đường 3/2, Tp. Cần Thơ. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814

Website: <http://www.ctu.edu.vn/knn> email: [dminh@ctu.edu.vn](mailto:dminh@ctu.edu.vn), [vtanh@ctu.edu.vn](mailto:vtanh@ctu.edu.vn)

---

## **BỆNH CHUYÊN KHOA**

### **CHƯƠNG 16:**

### **BỆNH HẠI CÂY XA BÔ (HỒNG XIÊM)**

## CHÖÔNG XVI

### BỆNH HẠI CÂY XA BOA(HÔNG XIÊM)

#### BỆNH NÓM LẠU *Pestalotia*

##### I. Triệu chứng:

Tên lá có nhiều nấm bình, lúc đầu nhỏ có màu nâu rồi nấm bình lớn dần có hình tròn, đường kính 1-3 mm, có tâm xám trắng viền màu nâu sẫm hay nâu rồi nâu sẫm hình thành ở nấm lá những vết nứt, nhỏ bằng đầu kim ở tâm nấm bình.

##### II. Tác nhân:

Do nấm *Pestalotia versicolor* Speg.

##### III. Biện pháp phòng trừ:

Phun các loại thuốc thông thường như hỗn hợp Bordeaux, Copper Zinc, Copper-B, Zineb hay Benomyl ở nồng độ 2/1000.

#### BỆNH THÂN THỖ

##### I. Triệu chứng :

Tên cây 2 mặt lá có các nấm bất đẳng, màu vàng. Nấm bình sau đó biến sang màu xám trắng hay nâu nhạt và tạo nhiều ổ nấm trên thân. Nhiễm nặng, lá sẽ bị vàng.

##### II. Tác nhân :

Do nấm *Glomerella cingulata* .

##### III. Biện pháp phòng trừ :

Phun ngừa nấm bằng thuốc Zineb 0,2% hoặc 2/1000.

## **BỆNH NẤM LÁ *Phaeophleospora***

### **I. Triệu chứng :**

Trên lá có nhiều chấm tròn, nhỏ màu nâu hay nâu tím màu xám trắng. Lá bị khô và rụng sớm. Do lá bị rụng nhiều nên năng suất giảm.

### **II. Tác nhân :**

Do nấm *Phaeophleospora indica* Chim.

### **III. Biện pháp phòng trừ :**

Phun ngừa nấm bằng thuốc Zineb (2/1000) hay Copper-Zinc (3/1000).

## **BỆNH NẤM RONG**

### **I. Triệu chứng :**

Lá có các chấm tròn đường kính khoảng 0,5-1cm; màu nâu trên có viền trắng. Mặt dưới nấm bình có màu nâu nhạt.

### **II. Tác nhân:**

Do một loại rong có tên là *Cephaleuros virescens*.

### **III. Biện pháp phòng trừ:**

Phun các loại thuốc gốc đồng, như: hỗn hợp Bordeaux 1% , Copper-Zinc 0,2-3/1000.

## **BỆNH CHẤM BÌA LÁ**

### I. Triệu chứng :

Độc theo bìa lá có các vết bất đẳng, nhỏ, màu nâu. Sau đó các nốt liền kết làm lá chầy tổng mang bất đẳng.

### II. Tác nhân:

Do nấm *Fusicoccum sapoticola* Chinn Rao.

### III. Biện pháp phòng trừ :

Phun Zineb, Maneb, Benomyl ở nồng độ 2/1000.

## BỆNH THỐI TRÁI

Có nhiều loại nấm gây thối trái sáo, như *Phytophthora palmivora*, *Pestalotia versicolor*, *Botryodiplodia theobromae* và *Pestalotia sapotae* P. Henm.

Nên ngâm ngay nên thu hoạch trái vào những ngày nắng, tránh làm xát xát và vệ sinh kỹ theo vĩa. Có thể ngâm trái vào nước thuốc Maneb (3/1000), Thiabendazole hay Benomyl (500 ppm).

